

ANALYSE 3

[Dérivation]

Exercice 1. Soit $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} & \text{si } x \leq 0 \\ \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| & \text{si } x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[. \end{cases}$$

- La fonction f est-elle continue en 0?
- Montrer que $\frac{f(x)}{x} = \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x}$ pour tout $x \in]0, 1[$.
- La fonction f est-elle dérivable en 0?
- Dresser le tableau de variation de f et préciser les limites aux bornes de l'ensemble de définition.

Exercice 2. Soit $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} x\sqrt{-\ln x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

- Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.
- Montrer que pour tout $x \in]0, 1[$ on a $-\ln x > 1-x$ et étudier la dérivabilité de f en 1.
- Dresser le tableau de variation de f et donner l'allure de la courbe représentative de f .

Exercice 3. On pose $f(x) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)$.

Montrer que f peut être prolongée par continuité sur \mathbb{R} en une fonction continue et dérivable sur \mathbb{R} .

Exercice 4. (partiel 2006)

On définit les fonctions f_1, f_2 en posant $f_1(x) = \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ et $f_2(x) = \frac{\sqrt{1-x}-1}{x}$.

- Déterminer les domaines de définition de f_1 et f_2 .
- Rappeler la définition de la dérivée d'une fonction f en un point x_0 .
- Écrire le rapport de dérivation au point $x_0 = 0$ pour les fonctions $x \mapsto \sqrt{1+x}$ et $x \mapsto \sqrt{1-x}$.
- Déterminer les limites de $f_1(x)$ et $f_2(x)$ lorsque x tend vers 0.
- Montrer qu'on peut prolonger f_1 et f_2 par continuité à l'origine.

Exercice 5. (partiel 2007) Soit a, b des paramètres réels et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & \text{si } x > 0 \\ (x+a)^2 + 2(x+a) + b & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

- Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
- Quelle relation doivent vérifier a et b pour que f soit continue en 0?
- On suppose désormais que f est continue à l'origine.
 - Calculer $f'_g(0)$ et $f'_d(0)$.
 - Peut-on choisir a et b pour que f soit dérivable en 0?

Exercice 6.

On considère la fonction f définie sur $] -1, +\infty[$ par $f(0) = 0$, et $f(x) = \frac{1}{x}(\ln(1+x) - x - \frac{1}{2}x^2)$ pour $x \neq 0$.

- Montrer que f est continue sur $] -1, +\infty[$.
- La fonction f est-elle dérivable sur $] -1, +\infty[$? Déterminer $f'(0)$.
- La fonction f est-elle de classe C^1 sur $] -1, +\infty[$?

Exercice 7. On pose $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1+x}{1+x^2}} & \text{si } x > 0 \\ 1 - \ln(1 - \frac{1}{2}x) & \text{si } x < 0. \end{cases}$

- Déterminer le domaine de définition D de f .
- Montrer que f est continue sur D .
Peut-on prolonger la fonction f en une fonction continue sur \mathbb{R} ?
- La fonction obtenue est-elle dérivable sur \mathbb{R} ?
- Donner l'équation de la tangente en 0 à la courbe représentative de f .

[Accroissements finis]

Exercice 8.

- Énoncer le théorème de Rolle.
- En utilisant ce théorème, montrer que l'équation $3x^5 + 15x - 1 = 0$ admet une unique racine réelle.

Exercice 9. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur \mathbb{R} telle que $f(0) = 0$, $f(1) = -1$ et $f(2) = 1$. Montrer qu'il existe $c \in]0, 2[$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice 10. Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{2}{x})$.

- Montrer que $-\frac{1}{2} \leq f'(x) \leq \frac{1}{2}$ pour tout $x \geq 1$.
- Montrer que pour tous $a, b \geq 1$ on a $|f(b) - f(a)| \leq \frac{1}{2}|b - a|$.
- Vérifier que $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ et déduire de la question précédente que $|f(x) - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{2}|x - \sqrt{2}|$ pour tout $x \geq 1$.
- On définit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en posant $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.
 - Montrer par récurrence qu'on a $1 \leq u_n \leq 2$ pour tout n .
 - Montrer par récurrence qu'on a $|u_n - \sqrt{2}| \leq 2^{-n}$ pour tout n .
 - Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et déterminer sa limite.
Expliquer comment calculer une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-6} près en utilisant la suite $(u_n)_n$.

Exercice 11. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 1$ et la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

- Étudier la fonction f et en déduire que $f([0, 1]) \subset [0, 1]$.
- Étudier la fonction f' et en déduire que $|f'(x)| \leq \frac{1}{4}$ pour $x \in [0, 1]$.
- Montrer qu'on a $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{4}|x - y|$ pour tous $x, y \in [0, 1]$.
- Montrer qu'il existe un unique réel $\alpha \in [0, 1]$ tel que $f(\alpha) = \alpha$.
- Montrer qu'on a $|u_n - \alpha| \leq 4^{-n}$ pour tout n . La suite $(u_n)_n$ converge-t-elle ?
Trouver un entier N pour lequel $|u_N - \alpha| \leq 10^{-4}$.

Exercice 12. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^3 et a un réel fixé. Déterminer les limites suivantes en fonction des dérivées de f en a :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+t) - f(a)}{t}, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+t) - f(a-t)}{t}, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+t) + f(a-t) - 2f(a)}{t^2},$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+3t) - 3f(a+2t) + 3f(a+t) - f(a)}{t^3}.$$

Application : déterminer $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2}(\sqrt{2+t} + \sqrt{2-t} - 2\sqrt{2})$.

Exercice 13. Soit $a > 0$ et $f : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que $f(0) = f(a) = 0$ et $f'(0) = 0$.

- Exemple : $a = 2\pi$ et $f(x) = 1 - \cos x$. Tracer l'allure du graphe de f sur $[0, 2\pi]$. Discuter graphiquement l'existence de points $(x, f(x))$ en lesquels la tangente au graphe de f passe par l'origine.
- Montrer que la dérivée de la fonction $x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ s'annule sur $]0, a[$.
Montrer qu'il existe au moins 2 points du graphe de f sur $[0, a]$ en lesquels la tangente passe par l'origine.

Exercice 14. (partiel 2011)

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ on définit une fonction $f_n : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ en posant $f_n(x) = n(\sqrt[n]{x} - 1) - \ln x$.

- On fixe un entier $n \in \mathbb{N}^*$.
 - Rappeler la formule exprimant $\frac{y^n - 1}{y - 1}$ comme polynôme pour tout $y \neq 1$.
 - Montrer que $y - 1 \leq \frac{1}{n}(y^n - 1)$ pour tout $y \geq 1$.
- On fixe un entier $n \in \mathbb{N}^*$.
 - Calculer et factoriser $f'_n(x)$, pour tout $x > 0$.
 - Monter que pour tout $x \geq 1$ on a $|f'_n(x)| \leq \frac{x-1}{n}$.
 - En déduire qu'on a $|f_n(x)| \leq \frac{(x-1)^2}{n}$ pour tout $x \geq 1$. (On notera que $f_n(1) = 0$.)
- On fixe un réel $x \geq 1$.
 - Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[n]{x} - 1)$.
 - Montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{x} - 1) = \ln x$.
Ce résultat est-il encore valable pour $x \in]0, 1[$? (On pourra poser $y = 1/x$.)

[Études de fonctions]

Exercice 15. (partiel 2011)

Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = (x + 2)e^{\frac{1}{x}}$ pour $x \neq 0$.

- Déterminer les limites de f en 0^+ et 0^- . Que peut-on en déduire?
- Déterminer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.
- Étudier les variations de la fonction f sur \mathbb{R}^* .
- Montrer que f est dérivable à gauche en 0. Que peut-on en déduire pour la courbe représentative de f ?
- (Question hors barème)
 - Faire un développement limité au voisinage de 0 de la fonction $g(y) = yf(\frac{1}{y})$.
 - Trouver des réels a, b, c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x} + \epsilon(x)$, avec $\lim_{x \rightarrow \infty} \epsilon = 0$.
 - En déduire que la courbe représentative de f admet au voisinage de $+\infty$ une asymptote dont on donnera l'équation et la position par rapport à la courbe.
- Représenter graphiquement la courbe de f avec tous les éléments obtenus aux questions précédentes.

Exercice 16. On se propose d'étudier le graphe de la fonction $f : x \mapsto x^2 \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right)$.

- Déterminer le domaine de définition de f et étudier sa continuité.
- Calculer la dérivée f' et l'écrire sous la forme $f'(x) = xv(x)$.
- Étudier les variations de $v(x)$. En déduire le signe de $f'(x)$ en fonction de x .
- Effectuer un développement limité de $u \mapsto uf(\frac{1}{u})$ à l'ordre 1 en 0.
(On admettra que $\arctan(t) = t + t^2\epsilon(t)$ avec $\lim_0 \epsilon = 0$.)
En déduire que le graphe de f admet une asymptote D en $+\infty$ et $-\infty$ dont on précisera l'équation.
- Montrer que le graphe de f coupe D en un unique point d'abscisse x_0 , et que $x_0 \in [-2, -1]$. Pour cela on pourra étudier la fonction g définie par

$$g(x) = \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right) + \frac{1-x}{x^2}.$$

- Calculer $f(0)$ et $f(-2)$. Construire le graphe de f .

Exercice 17. Représenter l'allure du graphe de $f : x \mapsto e^{1/x} \sqrt{x(x+1)}$ et étudier l'existence d'asymptotes.**Exercice 18.** (partiel 2011)

On considère la fonction f définie par la formule $f(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - x^4}}{x}$.

- Déterminer l'ensemble de définition D de f et vérifier que f est impaire.
Montrer qu'on peut étendre f par continuité à $[-1, 1]$: on notera encore f cette extension.
- Étudier la dérivabilité de f sur D . On étudiera notamment l'existence de demi-tangentes en -1 et 1 .
- En multipliant l'expression de f par $1 + \sqrt{1 - x^4}$ en haut et en bas, montrer que f est dérivable sur $] -1, 1[$.
Calculer la dérivée correspondante.
- Établir le tableau de variations de f et représenter l'allure de son graphe.